

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 365 DEL 3 MARZO 2017

**AGGIORNAMENTO ED ESTENSIONE DELL'OFFERTA VACCINALE PER L'INFANZIA E L' ADOLESCENZA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

Le **vaccinazioni previste per l'infanzia e l'adolescenza** come offerta attiva e gratuita, salvo diversamente indicato, sono schematizzate con i relativi intervalli di somministrazione nella tabella seguente..

Vaccino	Nascita	3° mese <sup>1</sup>	5° mese	7° mese	9° mese	13° mese <sup>1</sup>	14° mese	15° mese	6° – 7° anno <sup>1</sup>	12°-18° anno <sup>1</sup>
Difterite-tetano-pertosse		DTaP	DTaP			DTaP			DTaP <sup>6</sup>	dTap <sup>7</sup>
Poliomielite		IPV	IPV			IPV			IPV	IPV <sup>7</sup>
Epatite B	HBV <sup>2</sup>	HBV	HBV			HBV				
Haemophilus influenzae b		Hib	Hib			Hib				
Morbillo-rosolia-parotite-varicella							MPRV o MPR+V PCV13		MPRV o MPR+V	
Pneumococco		PCV13 <sup>4</sup>	PCV13							
Meningococco C						Men C <sup>5</sup>				Men ACWY <sup>8</sup>
Meningococco B				Men B <sup>9</sup>	Men B			Men B		
Papilloma virus										HPV <sup>9</sup>
Varicella										Varicella <sup>10</sup>
Rotavirus		Rotavirus <sup>11</sup>								
Influenza		Influenza <sup>12</sup>								
Epatite A		Epatite A <sup>13</sup>								
Encefalite da zecca		TBE <sup>14</sup>								

**Legenda:**

DTaP = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione pediatrica

dTpa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti

IPV = vaccino antipolio inattivo

HiB = vaccino contro le infezioni invasive da *Haemophilus influenzae b*

PCV13 = vaccino pneumococcico coniugato 13 valente

Men B = vaccino meningococcico B coniugato

Men C = vaccino meningococcico C coniugato

Men ACWY = vaccino meningococcico tetravalente ACWY coniugato

MPRV = vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella

MPR = vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia

V = vaccino contro la varicella

HBV= vaccino antiepatite B

Epatite A = vaccino antiepatite A

HPV= vaccino anti-papillomavirus

Influenza = vaccino contro l'influenza stagionale

Rotavirus = vaccino contro i rotavirus

TBE = vaccino contro l'encefalite da zecca

**Note alla tabella**

1. **Terzo mese** di vita si intende il periodo che intercorre dal compimento del 61° giorno di vita fino al 90° giorno di vita, ovvero dal compimento della 8<sup>a</sup> settimana di vita fino alla 12<sup>a</sup> settimana di vita.  
**13° mese** si intende dal compimento di 12 mesi e un giorno fino al compimento di 13 mesi di vita.  
**6°-7° anno** si intende dal 5° compleanno e 1 giorno al 7° compleanno.  
**12° -18° anno** si intende da 11° compleanno e 1 giorno fino a 18° compleanno.
2. Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig specifiche, la prima dose di vaccino. Il ciclo va completato con la 2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima; a partire dalla 3° dose, che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il calendario con il vaccino combinato esavalente.
3. Meningococco di gruppo C in dose singola. Nei soggetti a rischio la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal terzo mese di vita con tre dosi complessive, di cui l'ultima, comunque, dopo il compimento dell'anno di vita.
4. Pneumococco coniugato (PVC13) gratuito, presso i servizi vaccinali, fino al compimento dei 5 anni di vita. Successivamente gratuito solo nei soggetti a rischio.
5. Meningococco di gruppo B: vaccinazione attiva dei nuovi nati a partire dalla coorte dei nati 2015. Gratuito, presso i servizi vaccinali, fino al compimento dei 5 anni di vita. Successivamente gratuito solo nei soggetti a rischio.
6. La quarta dose, l'ultima della serie primaria, va somministrata nel 6°-7° anno di vita. È possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) a condizione che i genitori siano adeguatamente informati dell'importanza del richiamo in adolescenza e che siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale.
7. Il vaccino difterite-tetano-pertosse-polio è somministrato con la seconda dose di HPV. A partire dal completamento della serie primaria, i successivi richiami devono essere effettuati ogni 10 anni.
8. Il vaccino tetravalente coniugato anti-meningococco ACWY è somministrato con la prima dose di vaccino anti HPV nel dodicesimo anno. La vaccinazione anti-meningococco ACWY deve essere somministrata sia a chi in passato abbia già ricevuto una dose di meningococco C, sia a chi nell'infanzia non abbia mai effettuato tale vaccinazione. Il diritto alla gratuità della vaccinazione antimeningococcica è esteso fino al compimento dei 25 anni di età.
9. Offerta vaccinale ad entrambi i sessi nel dodicesimo anno di vita, in somministrazione con vaccino tetravalente coniugato anti-meningococco ACWY e vaccino difterite-tetano-pertosse-polio. Il diritto alla gratuità della vaccinazione HPV, è esteso fino al compimento dei 25 anni di età.
10. Adolescenti con anamnesi negativa per varicella. Somministrazione di due dosi a distanza di  $\geq 1$  mese l'una dall'altra.
11. Introduzione della vaccinazione anti-rotavirus a tutti i nati a partire dal 01.01.2018, somministrata per via orale, a partire dalla 6° settimana di vita (2 o 3 dosi a seconda del prodotto) eventualmente in co-somministrazione con le altre vaccinazioni previste in questa fascia di età. Offerta attiva e gratuita alle categorie a rischio; gratuita per l'età target.
12. Bambini a rischio di età superiore ai 6 mesi di vita secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute emanata ogni anno.
13. Bambini/ragazzi fino a 16 anni, figli di immigrati che si rechino, anche per brevi periodi di tempo nei Paesi endemici di origine.
14. Offerta gratuita ai residenti in Friuli Venezia Giulia, con compartecipazione alla spesa per i non residenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE