

Boschi e aree di rilevanza faunistica

- A) Pineta al margine di San Servolo, fino all'area ad est della SIOT.
- B) Boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso.
- C) Draga Sant'Elia.
- D) Bosco di faggi e querce ad est di Grozzana: bosco ceduo con presenza di picidi.
- E) Bosco misto all'interno della Riserva della Val Rosandra.
- F) Tutto il bosco di Monte Grociana.
- G) Pineta matura del monte Cocusso.
- H) Bosco Igouza con Astore nidificante, Picchio cenerico e picchio nero.
- I) Zona rupestre tra landa e pineta a sud della cava Scoria. Presenza del Gufo reale.
- J) Bosco Keller: la presenza di faggi, querce e abete bianco favorisce l'insediamento di picchi di varie specie.
- K) Bosco Porenta (a sud della strada) e bosco Nobile (a nord), con la più alta densità di Picchi grazie alla presenza, fra gli altri, di faggio.
- L) Pineta del Bosco Francovez.
- M) Pineta matura del Monte Calvo, dal Campo Carri al Monte Spaccato.
- N) Dalla conca di Percedol fino alla zona di Ferneti; 2) Cava di Monrupino (parte dismessa) con nido del Gufo reale.
- O) Pineta matura di monte Grisa, dall'altezza del sentiero Cobolli (quota Tempio Mariano) verso l'altopiano.
- P1) Falesie a picco dalla quota del Tempio Mariano fino alla Napoleonica (Habitat BL18 Ostrioquerceti del Carso) per il passero solitario, il rondone alpino, l'occhiocotto e specie mediterranee
- P2) Querceto termofilo sotto monte Grisa, per la presenza dello zigolo nero, picchio rosso minore, sparviere.
- Q) Pineta matura ad ovest del Col dell'Anitra ed a sud del Piccolo Lanaro.
- R) Bosco da Monrupino a Samatorza a ridosso del confine.
- S) Pineta di Santa Croce.
- T) Pineta a nord di Slivia (poiana, astore, pecchiaiolo).
- U) Zona a landa e limitrofa (GM8 Arbusteti policormici).
- V) Cava di Aurisina, esterna al SIC/ZPS: ha come nidificanti rondone maggiore, rondine montana, monachella, passero solitario, sterpazzolina, occhiocotto, corvo imperiale.
- P10) Area della cava di Bristie (allo stato attuale tagliata a metà dal perimetro del SIC/ZPS) nella quale si riproduce il Corvo imperiale e vi è la presenza di uccelli di ambiente montano (pettirosso nidificante).